

إستبيان حول صعوبات القسطرة البولوية (تركيب الدليل) الدورية

الشدة				التواتر (عدد المرات)				
قوية	متوسطة	ضعيفة	لا	دائمًا	في معظم الأحيان	في بعض الأحيان	أبدًا	
								عندي أوجاع أثناء القسطرة البولوية (تركيب الدليل).
								عندي إحساس بعزقلة (سدّد) عند إدخال القسطرة البولوية (الدليل) تزول سريعاً دون الحاجة إلى استعمال القوة أو الانتظار.
								عندي إحساس بعزقلة (سدّد) عند إدخال القسطرة البولوية (الدليل) تستوجب الانتظار قبل مواصلة إدخالها.
								عندي إحساس بعزقلة (سدّد) عند إدخال القسطرة البولوية (الدليل) تستوجب استعمال القوة لمواصلة إدخالها.
								عندي إحساس بعزقلة (سدّد) متواصلة أثناء إدخال القسطرة البولوية (الدليل) على كامل مجرى البول.
								عندي إحساس بالانسداد التام أثناء إدخال القسطرة البولوية (الدليل) مما يستوجب الانقطاع والمحاولة في وقت لاحق.
								أنا مضطرّ إلى اتخاذ وضعيّة أخرى أو إلى فتح مجرى البول بأصابعي لمواصلة إدخال القسطرة البولوية (الدليل).
								عندي انقباضات عضليّة (تكبيش)، أو تشنّجات، أو أوجاع، أو تصلّب في الساقين، أو رعشة، أو أوجاع في الرأس، أو تعرّق.
								عندي دم أثناء عمليّة القسطرة البولوية (تركيب الدليل).
								أنا مضطرّ إلى اتخاذ وضعيّة أخرى أو إلى الإستعانة بأصابعي لإفراغ مثانتي (شكارة البول) تماماً.
								عندي إحساس بمقاومة (تكبيش) عند إخراج القسطرة البولوية (الدليل).
								عندي تسربات للبول أثناء القسطرة البولوية (تركيب الدليل).
								عندي أوجاع تبقى إلى ما بعد إخراج القسطرة البولوية (الدليل).